

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1060

Hémiplégie en phase aiguë

RUBRIQUES DE BILAN

VALEURS

EXAMEN GENERAL

Infirmités antérieures Désorientation temporo-spatiale | Incontinence vésicale
 Incontinence anale | Troubles de la mémoire | Troubles de la vue
 Troubles de l'audition | Troubles de l'équilibre

Observations

ETAT DE VIGILANCE

Echelle de coma de Glasgow (GCS)

Observations

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES NEURO-PSYCHOLOGIQUES

Comportement Activité normale
 Augmentation activité
 euphorie
 insomnie
 anxiété
 nervosité
 incontinence émotionnelle
 irritabilité
 Diminution activité
 pleurs
 régression
 apathie
 perte d'appétit
 Anomalie comportementale
 détérioration mentale
 état démentiel

Troubles somatognosiques Anosognosie | Autotopoagnosie | Hémiasomatognosie | Hémignégligence
 Pushing syndrom

Troubles sensoriels Aucun
 Astéréognosie
 Agnosie visuelle
 Agnosie auditive

Troubles du langage Aucun
 Aphasie
 Dysarthrie

Approche synthétique

Schéma corporel Altéré | Normal
 Compréhension Altérée | Normale
 Langage Altéré | Normal
 Mémoire Altérée | Normale

Observations (neuro-psychologiques)

DOULEURS

Douleurs d'origine centrale

Localisation et déclenchement Rachis
 Rachis cervical
 spontanément
 à la palpation
 à la mobilisation passive
 à la mobilisation active
 à la mobilisation active contrariée
 Rachis dorso-lombaire
 spontanément
 à la palpation

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1060

Hémiplégie en phase aiguë

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	à la mobilisation passive
	à la mobilisation active
	à la mobilisation active contrariée
	Membre supérieur
	Epaule - bras
	gauche
	droit
	spontanément
	à la palpation
	à la mobilisation passive
	à la mobilisation active
	à la mobilisation active contrariée
	Poignet - main
	gauche
	droit
	spontanément
	à la palpation
	à la mobilisation passive
	à la mobilisation active
	à la mobilisation active contrariée
	Membre inférieur
	Hanche
	gauche
	droite
	spontanément
	à la palpation
	à la mobilisation passive
	à la mobilisation active
	à la mobilisation active contrariée
	Jambre - pied
	gauche
	droit
	spontanément
	à la palpation
	à la mobilisation passive
	à la mobilisation active
	à la mobilisation active contrariée
ECPA	
EVA	
EVS	0 - Absence de douleur 1 - Douleur faible 2 - Douleur forte 3 - Douleur intense 4 - Douleur très intense
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES DE LA SENSIBILITE	
Sensibilité objective	
Troubles de la perception	Anesthésie Hypoesthésie Hyperesthésie Aucun trouble Disparition des troubles
Sensibilité proprioceptive	Aucune Diminuée Normale
Sensibilité stéréognosique	Aucune Diminuée Normale
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES VASOMOTEURS & TROPHIQUES	
Troubles circulatoires	
	Augmentation rythme cardiaque Cyanose Douleur au mollet Douleur à la mise en tension du mollet Douleur thoracique Essoufflement (même au repos) Gêne respiratoire (toux)

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1060

Hémiplégie en phase aiguë

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	Ulcère(s) variqueux
Facteurs de risques d'escarres	
Echelle de BRADEN	
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES ARTICULAIRES MEMBRES SUPERIEURS	
Epaule	
Mobilité passive épaule gauche	Normale Anormale
Particularité épaule gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation épaule gauche	Adduction Rotation interne Add./Flex./Rot. int.
Déficit de mobilité épaule gauche	Flexion Extension Abduction Adduction Rot. externe Rot. interne Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction spasticité
Mobilité passive épaule droite	Normale Anormale
Particularité épaule droite	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation épaule droite	Adduction Rotation interne Add./Flex./Rot. int.
Déficit de mobilité épaule droite	Flexion Extension Abduction Adduction Rot. externe Rot. interne Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction spasticité
Coude	
Mobilité passive coude gauche	Normale Anormale
Particularité coude gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation coude gauche	Flessum Flex. en pronation Varus Valgus
Déficit de mobilité coude gauche	Flexion Extension Pronation Supination Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE **1060**

Hémiplégie en phase aiguë

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	oedème
	rétraction
	spasticité
Mobilité passive coude droit	Normale Anormale
Particularité coude droit	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation coude droit	Flessum Flex. en pronation Varus Valgus
Déficit de mobilité coude droit	Flexion Extension Pronation Supination Global Cause para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction spasticité
Poignet	
Mobilité passive poignet gauche	Normale Anormale
Particularité poignet gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation poignet gauche	Flexion Flex. en incl. cub.
Déficit de mobilité poignet gauche	Flexion Extension Incl. cubitale Incl. radiale Global Cause spasticité para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction
Mobilité passive poignet droit	Normale Anormale
Particularité poignet droit	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation poignet droit	Flexion Flex. en incl. cub.
Déficit de mobilité poignet droit	Flexion Extension Incl. cubitale Incl. radiale Global Cause spasticité para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction
Main	
Mobilité passive main gauche	Normale Anormale
Particularité main gauche	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie Arthrite Séquelles fracture

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1060

Hémiplégie en phase aiguë

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
Déformation main gauche	Doigts en griffe Pouce en adduction Main en fléau MP en extension Fléau, adductus du 1 Main plate Rhumatisme déformant
Déficit de mobilité main gauche	Flexion des doigts Extension des doigts Opposition Ouverture Global Cause spasticité para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction
Mobilité passive main droite	Normale Anormale
Particularité main droite	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie Arthrite Séquelles fracture
Déformation main droite	Doigts en griffe Pouce en adduction Main en fléau MP en extension Fléau, adductus du 1 Main plate Rhumatisme déformant
Déficit de mobilité main droite	Flexion des doigts Extension des doigts Opposition Ouverture Global Cause spasticité para-ostéo-arthropathie douleur oedème rétraction
Diagnostic kinésithérapique	

TROUBLES ARTICULAIRES MEMBRES INFERIEURS

Hanche

Mobilité passive hanche gauche	Normale Anormale
Particularité hanche gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation hanche gauche	Flessum Rot. interne Flessum et Rot.int. Extension Rot. externe Ext. + rot.ext. Abductum
Déficit de mobilité hanche gauche	Abduction Adduction Extension Flexion Rot. externe Rot. interne Global Cause oedème rétraction spasticité para-ostéo-arthropathie douleur
Mobilité passive hanche droite	Normale Anormale
Particularité hanche droite	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE **1060**

Hémiplégie en phase aiguë

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
Déformation hanche droite	Flessum Rot. interne Flessum et Rot.int. Extension Rot. externe Ext. + rot.ext. Abductum
Déficit de mobilité hanche droite	Abduction Adduction Extension Flexion Rot. externe Rot. interne Global Cause oedème rétraction spasticité para-ostéo-arthropathie douleur
Genou	
Mobilité passive genou gauche	Normale Anormale
Particularité genou gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation genou gauche	Varus Valgus Flessum Recurvatum Valgus + flessum Varus + flessum
Déficit de mobilité genou gauche	Flexion Extension Rot. externe Rot. interne Global Cause oedème rétraction spasticité para-ostéo-arthropathie douleur
Mobilité passive genou droit	Normale Anormale
Particularité genou droit	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation genou droit	Varus Valgus Flessum Recurvatum Valgus + flessum Varus + flessum
Déficit de mobilité genou droit	Flexion Extension Rot. externe Rot. interne Global Cause oedème rétraction spasticité para-ostéo-arthropathie douleur
Tibio-tarsienne	
Mobilité passive TT gauche	Normale Anormale
Particularité TT gauche	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation TT gauche	Equin

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1060

Hémiplégie en phase aiguë

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
Déficit de mobilité TT gauche	Flexion
	Extension
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
	spasticité
Mobilité passive TT droite	Normale Anormale
Particularité TT droite	Arthrose Arthrodèse Prothèse Néo Greffe peau Périarthrite
	Subluxation Arthrite Séquelles fracture Oedeme Raideur anormale
Déformation TT droite	Equin
Déficit de mobilité TT droite	Flexion
	Extension
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
	spasticité
Pied	
Mobilité passive pied gauche	Normale Anormale
Particularité pied gauche	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie
	Arthrite Séquelles fracture
Déformation pied gauche	Varus Valgus Orteils en griffe Pied plat Pied creux
Déficit de mobilité pied gauche	Valgus
	Varus
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
	spasticité
Mobilité passive pied droit	Normale Anormale
Particularité pied droit	Arthrose Arthrodèse Néo Greffe peau Algoneurodystrophie
	Arthrite Séquelles fracture
Déformation pied droit	Varus Valgus Orteils en griffe Pied plat Pied creux
Déficit de mobilité pied droit	Valgus
	Varus
	Global
	Cause
	para-ostéo-arthropathie
	douleur
	oedème
	rétraction
	spasticité

Diagnostic kinésithérapique

TROUBLES DU TONUS

Position du patient pour l'examen Assis | Couché | Debout

Spasticité membre supérieur (ASHWORTH modifiée)

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE

1060

Hémiplégie en phase aiguë

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
Adducteurs épaule	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Rotateurs internes épaule	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Fléchisseurs coude	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Pronateurs	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Fléchisseurs poignet	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Cubitaux	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Fléchisseurs des doigts	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Adducteurs / fléchisseurs du 1	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Abducteurs épaule	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Rotateurs externes épaule	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Extenseurs du coude	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1060

Hémiplégie en phase aiguë

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Supinateurs	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Extenseurs du poignet	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Extenseurs des doigts	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Spasticité membre inférieur (ASHWORTH modifiée)	
Fléchisseurs hanche	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Adducteurs hanche	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Fléchisseurs genou	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Releveurs du pied	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Everseurs du pied	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Extenseurs hanche	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement
Abducteurs de hanche	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement
	1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement
	2 Spasticité marquée, mobilisation facile
	3 Spasticité importante, mobilisation difficile
	4 Spasticité empêchant tout mouvement

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE 1060

Hémiplégie en phase aiguë

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
Extenseurs genou	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Abaisseurs du pied	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Inverseurs du pied	0 Pas de spasticité 1 Spasticité en fin de mouvement seulement 1+ Spasticité à partir de la moitié du mouvement 2 Spasticité marquée, mobilisation facile 3 Spasticité importante, mobilisation difficile 4 Spasticité empêchant tout mouvement
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES NEURO-MOTEURS	
Echelle d'ORGOGOZO	
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES DE L'EQUILIBRE	
Contrôle du tronc (Trunk Control Test)	
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES RESPIRATOIRES	
Encombrement bronchique	Aucun Important Modéré
Diagnostic kinésithérapique	
TROUBLES FONCTIONNELS	
Troubles de la déglutition	
Apparition	Jamais Rarement Fréquemment Systématiquement
Symptômes associés	Fausse route Hoquet Reflux gastro-oesophagien Régurgitation alimentaire Toux immédiate
Incontinence	Urinaire et fécale Urinaire Occasionnelle Aucune
Modified Rankin Scale	0 - Aucun symptôme d'incapacité 1 - Pas d'incapacités majeures 2 - Incapacités peu marquées 3 - Incapacités modérées 4 - Incapacités assez grave 5 - Incapacités très graves
Diagnostic kinésithérapique	
TRAITEMENTS	
Prévention des escarres	Apprentissage auto-contrôle position des membres Changement de position toutes les 2 - 3 heures Massage et surveillance des points d'appui
Prévention des troubles circulatoires	Bas anti-thromboemboliques Massage mobilisation passive membres inférieurs Surveillance membres inférieurs
Prévention des complications orthopédiques	Positionnement du patient au lit Immobilisation du membre supérieur sain Mobilisation passive lente membre sup.: épaule voie antéro-interne membre inf.: surveillance équin
Prévention des troubles respiratoires	Prévention encombrement toux assistée vibrations thoraciques accélération flux expiratoire Prévention enraidissement thorax mobilisation ceinture scapulaire

Bilan numéro :

Date :

Séances effectuées :

PATIENT

PRATICIEN

Nom / Prénom

Numéro assuré

FICHE **1060**

Hémiplégie en phase aiguë

RUBRIQUES DE BILAN	VALEURS
	mobilisation costale en expiration
	travail de l'ampliation thoracique en inspiration
	travail de la fermeture thoracique en expiration
Prévention des troubles de l'alimentation	Rééducation de la déglutition
Apprentissage transferts	Assis - debout Couché - assis Mise au fauteuil Retournements au lit
Mobilisations en phase flasque	Cou, tronc, ceinture scapulaire
	Du membre supérieur
	en passif lent
	élévation en rotation externe
	abduction pure
	rotation externe le long du corps
	en actif
	abaissement par étape
	contrôle de la position
	Du membre inférieur
	en passif lent
	TT et orteils en flexion dorsale
	genou en flexion
	hanche en extension
	en actif
	abaissement par étape
	contrôle de la position
Conseils	Installation du patient [prévention attitude vicieuse]
	Eviter assise en arrière (prévention rétropulsion)
	Ne pas tirer sur le bras du patient
	Méthodes de mobilisation et d'auto-mobilisation
	Se positionner du côté lésé pour éviter héminégligence
	Utiliser les substituts de la communication orale
	Précautions en cas de troubles de la sensibilité
	Port de chaussures souples à velcro et sans talon
COMMENTAIRES	
Commentaires	